

Памятка населению

Ящур— острое высококонтагиозное остро протекающее вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которыми болеет также и человек, характеризующееся интоксикацией,пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а также кожи межпальцевых складок и околонугтевого ложа.

Ящур довольно широко распространен среди животных. В ряде стран заболевание носит характер эпизоотии (эпидемий среди животных), повторяющихся через определенные промежутки времени. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот,свиньи,козы,овцы,олени.

Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замораживанию, но быстро погибает при нагревании до 60С, воздействии ультрафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ.

Инфекционный процесс парнокопытных характеризуется тяжелым течением:высокой температурой тела, афтозными высыпаниями и язвениями в области слизистых оболочек полости рта, языка, носоглотки, носа, губ, на коже в межкопытных щелях, на вымени, иногда около рогов.Обильное слюноотделение, животные очень осторожно пережевывают корм, глотание болезненное. Общая продолжительность болезни у животных от 10 до 15 дней, продолжительность инкубационного (скрытый) периода 2 —4 дня. При злокачественном течении ящура, особенно у коров, более чем у 50 % заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2 — 3 суток. Животные заражаются при контакте с больными животными и вирусоносителями, воздушно-капельным путем, при контакте с инфицированными предметами и инвентарем, при поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов а также через молоко и другую продукцию, полученную от больных животных.

Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

Профилактика ящура приобретать, крупный рогатый и мелкий рогатый скот только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, из местности благополучной по особо опасным инфекционным заболеваниям, том числе ящура

информировать государственные ветеринарные учреждения о вновь поступивших животных;

карантинировать поступивших животных в течение 30 дней.

по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий , в том числе вакинции против ящура.

Обязательная Вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура с 4 месячного возраста

Спрвки по телефону 887777 -5-15-63

Государственная ветеринарная служба Майкопского района